

附件三

醫改會發現在藥局(藥妝店)買到的指示藥所附說明書，並非政府核准版本


(1) 醫改會買到的藥品說明書

● 非類固醇 • 非比林系的消炎 • 鎮痛 • 解熱劑

是由一系列的 Phenylalkanoic Acid 經研究所開發之新型非類固醇、非比林系的消炎、鎮痛、解熱劑。對各科領域內之炎症性疼痛疾患的消炎鎮痛、炎症性發熱疾患的消炎退熱，皆能迅速發揮症狀緩解作用。

成分：每錠含有：

Ibuprofen..... 200mg



2-(4-Isobutylphenyl) propionic acid

- 特點：
1. 是一種非類固醇、非比林系的消炎、鎮痛、解熱劑。
 2. 藥理活性跟 Aspirin 之比較：消炎作用為其 16~32 倍。
鎮痛作用為其 8~32 倍。
解熱作用為其 20 倍。
 3. 經口投與後迅速被吸收，30~90 分鐘內可達最高血中濃度，實為速效性藥劑。
 4. 因無耽溺性與習慣性，且連續使用效果也不會減弱，故適宜長期治療之用。
 5. 使用他種抗炎症劑無效之病例，換用本劑常可奏效。
 6. 臨床應用廣及內科、外科、耳鼻咽喉科、婦產科、皮膚科，皆能獲得確實之療效。

適應症：△下列疾患之消炎鎮痛：

關節痛及關節炎、神經痛及神經炎、腰背痛。

△手術及外傷後之消炎鎮痛。

用法用量：成人一日三次，每次 1 錠，必要時可增至 2 錠。對感染性疾患，可與化學治療劑併用。本藥須由醫師處方使用。

包裝：1000 粒瓶裝。

(2) 其實食藥署核准的藥品說明書，應該長這樣

•非類固醇・非比林系的消炎・鎮痛・解熱劑

是由一系列的 Phenylalkanoic acid 經研究所開發之新型非類固醇、非比林系的消炎、鎮痛、解熱劑。對各科領域內之炎症性疼痛疾患的消炎鎮痛、炎症性發熱疾患的消炎退熱，皆能迅速發揮症狀緩解作用。

【成分】每錠含有

Ibuprofen.....200mg

【賦形劑】

L-HPC、Silicon dioxide、HPMC 606、Sodium starch glycolate、dicalcium phosphate dihydrate、Mg. stearate、PEG 6000、Titanium dioxide、vanillin、Tartrazine aluminum lake、Polishing wax 103、Castor oil。

【特點】

- 1.是一種非類固醇、非比林系的消炎、鎮痛、解熱劑。
- 2.藥理活性跟 Aspirin 之比較：消炎作用為其 16~32 倍。
鎮痛作用為其 8~32 倍。
解熱作用為其 20 倍。
- 3.經口投與後迅速被吸收，30~90 分鐘內可達最高血中濃度，實為速效性藥劑。
- 4.因無耽溺性與習慣性，且連續使用效果也不會減弱，故適宜長期治療之用。
- 5.使用他種抗炎症劑無效之病例，換用本劑常可奏效。
- 6.臨床應用廣及內科、外科、耳鼻喉科、婦產科、皮膚科、皆能獲得確實之療效。

【適應症】

- △下列疾患之消炎鎮痛：
關節痛及關節炎、神經痛及神經炎、腰背痛。
△手術及外傷後之消炎鎮痛。

【用法用量】

成人一日三次，每次 1 錠，必要時可增至 2 錠。對感染性疾患，可與化學治療劑併用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

- 1.使用消炎鎮痛劑治療乃為對症療法，而非原因療法。
- 2.用於治療慢性疾患（慢性風濕性關節炎）時應考慮下列事項：
 - 1)長期投與時，須定期作臨床檢查（尿液檢查、血液檢查及肝機能檢查）如發現有異常現象，則須採取減量或停藥等適當措施。
 - 2)考慮採用非藥物性療法。
- 3.用於治療急性疾患時，應考慮下列事項：
 - 1)對於急性炎症，須考慮其病痛及發熱程度而給藥。
 - 2)原則上應避免長期使用同一類藥品。
 - 3)如有原因療法，則應採用。
- 4.須仔細觀察患者之狀況，留意有否副作用發生。可能出現過度體溫下降、虛脫、四肢冷卻等症狀，對患者有高燒之幼兒及高齡或消耗性疾患之患者，給藥後尤須注意觀察患者之狀況。
- 5.本藥可能會遮蔽感染症狀之顯現，因此用於治療感染所引起之炎症時，必須合併使用適當之抗菌劑，同時仔細觀察，慎重投與。
- 6.儘量避免與其他消炎鎮痛劑合併使用。
- 7.對小兒及高齡患者，尤須注意有否副作用出現，並以最低之有效劑量來慎重投與。

【禁忌症】

- 1.消化性潰瘍患者。
- 2.重症之血液異常患者。

- 3.重症之肝障礙患者。
- 4.重症之腎障礙患者。
- 5.重症之心機能不全患者。
- 6.對本劑過敏之患者。
- 7.患有阿斯匹寧（Aspirin）氣喘或曾有該病歷之患者。

【對下列患者須慎重投與】

- 1.曾有消化性潰瘍病歷之患者。
- 2.患血液異常或曾有此種病歷之患者。
- 3.患有肝損害或曾有該病歷之患者。
- 4.心機能障礙之患者。
- 5.曾有過敏症病歷之患者。
- 6.支氣管氣喘之患者。

【副作用】

- 1.血液：可能會引起再生不良性貧血、顆粒球缺乏症、血小板減少等血液障礙，故須做血液檢查並小心觀察，如有異常狀況出現，必須立刻停藥。
- 2.過敏症：有時可能會產生 STEVENS-JOHNSON 症候群（發熱、皮膚粘膜發疹、紅斑、壞死性結膜炎等症候群）LYELL 症候群（中毒性表皮壞死症），發疹或誘發氣喘等症狀，遇有此等過敏症狀出現時，必須立刻停藥。
- 3.感覺器官：
 - 1)眼：可能有感覺異常等症狀出現，若有此等症狀出現時，必須立刻停藥。
 - 2)耳：可能出現重聽及耳鳴等症狀。
- 4.肝臟：可能出現黃疸及氨基轉移酶（TRANSAMINASE）值異常現象。
- 5.消化器官：可能會引起胃腸出血，遇有此等現象，必須立刻停藥。有時亦可能含有食慾不振、噁心、嘔吐、胃痛、下痢、胃部不快感等現象，或出現口內炎、便秘等症狀。
- 6.精神及神經系統：有時會出現頭痛、暈眩及抑鬱等症狀。
- 7.心臟血管系統：有時會出現低血壓等症狀。
- 8.其他：可能會出現浮腫。

【孕婦及授乳婦人之投與】

根據動物實驗報告，本藥對動物胎兒具有毒性，對孕婦及授乳婦人之安全性尚未確立，對於孕婦或可能懷孕之婦女及授乳之婦人不要投與。

【酒精警語】

若你每天喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問你的醫師你是否能服用【Ibuprofen】或其它鎮痛解熱劑，因為【Ibuprofen】可能造成胃出血。

【包裝】

6~1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。室溫保存。