

神秘客購買指示藥實測(B)

茫茫字海中想要看清楚**肝功能不佳、孕婦、兒童**等特殊族群能否使用，得要有好眼力，才能找到。

制前列腺素(Prostaglandins)的生成，而前列腺素為引起發炎、疼痛及發燒的主要因子，所以Diclofenac Sodium具有消炎、止痛、抗風濕及解熱等作用。

有效成分

每片 6g (10x14cm)/每片 3g (7x10cm)，含 Diclofenac Sodium 60mg。

注意事項

1. 本製劑只能用於完整皮膚，不可用於裂開的皮膚或開放性傷口。本製劑不要與眼睛及黏膜接觸。本品僅供外用，不可口服。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼、兒童無法取得之處。
3. 懷孕：尚未有研究報告顯示關於孕婦使用本製劑之安全性，因此本製劑於懷孕期間不應使用。由於可能造成子宮無力(Uterine inertia)和/或胎兒動脈導管過早閉合，因此在懷孕第三期使用本製劑為禁忌。動物研究尚未顯示任何直接或間接對於在懷孕期間胚胎/胎兒發展、分娩或產後發展的不良影響。
4. 授乳：本製劑是否分泌至人類乳汁中尚屬未知，因此本製劑於授乳期間不建議使用。若為不得已使用，本製劑不得用於乳房部位或大面積授予，更不可長期使用。
5. 除非醫師或藥師、藥劑生指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
6. 請勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
7. 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
8. 除非醫師或藥師、藥劑生指示，非類固醇抗發炎藥劑不可連續使用超過二星期。

警語

癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用非類固醇抗發炎藥劑會使病情惡化。

皮膚的黴菌感染有時不亦與其他皮膚炎區分，誤用非類固醇抗發炎藥劑會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

依據資料顯示，仍有極少數局部使用 diclofenac 引起肝功能異常之報告。

禁忌

對 Diclofenac Sodium、Acetylsalicylic acid 及其他非類固醇抗

用法用量

流汗時或清洗患處後，請先將患部洗淨、擦乾再予貼上。一天一片，可做適度之剪裁。請依病症與病人反應來決定治療持續的時間。建議要在兩週後檢查療效。
本製劑不建議使用於12歲以下之兒童。

發炎藥物，或對 Propylene glycol 有過敏反應者禁用本藥。
懷孕第三期禁用本藥。

副作用

1. 偶有搔癢、灼熱感、局部發紅、過敏性皮膚炎。
2. Diclofenac 局部治療期間發生全身反應與出現副作用的可能性較口服給與的機率小。假如長期大面積使用本製劑，不能完全排除全身性反應的可能性。
3. 不良反應依器官系統分類和發生頻率詳列於下表。發生頻率之定義為：極常見(1/10)、常見(1/100~<1/10)、不常見(1/1,000~<1/100)、罕見(1/10,000~<1/1,000)、極罕見(<1/10,000)。在各組發生頻率中，依不良反應的嚴重度降冪排列。

感染和寄生蟲感染	極罕見：膿皰性發疹
免疫系統的異常	極罕見：過敏(包含蕁麻疹)、血管性水腫
呼吸道、胸部及縱膈的異常	極罕見：氣喘
皮膚和皮下組織的異常	常見：皮膚炎(包含接觸性皮膚炎)、紅疹、紅斑、濕疹、搔癢 罕見：水泡性皮膚炎 極罕見：光敏感反應

交互作用

至今未有本製劑的交互作用報告。

過量

Diclofenac 局部使用的整體吸收性低，不易發生過量。使用不當及無意的過量(如用於兒童)會產生顯著的全身反應，此時要採取一般的非類固醇抗發炎藥中毒救治措施以治療過量，請即就醫。

