

附件3-2 神秘客購買指示藥實測(A)

● 非類固醇 ● 非比林系的消炎 ● 鎮痛 ● 解熱劑

膠衣錠 (bllets (Ibuprofen)

一系列的 Phenylalkanoic Acid 經研究所開發之新型非類固醇、非比林系的消炎、鎮痛、解熱劑。對各科領域內之炎症性疼痛疾患的消炎鎮痛、炎症性發熱疾患的消炎退熱，皆能迅速發揮症狀緩解作用。

成分：每錠含有：
Ibuprofen..... 200mg

CC(C)C(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)O

2-(4-Isobutylphenyl) propionic acid

特點：1. 是一種非類固醇、非比林系的消炎、鎮痛、解熱劑。
2. 藥理活性跟Aspirin之比較：消炎作用為其13~32倍。
鎮痛作用為其8~32倍。
解熱作用為其20倍。
3. 經口投與後迅速被吸收，30~90分鐘內可達最高血中濃度，實為速效性藥劑。
4. 因無耽溺性與習慣性，且連續使用效果也不會減弱，故適宜長期治療之用。
5. 使用他種抗炎症劑無效之病例，換用本劑常可奏效。
6. 臨床應用廣及內科、外科、耳鼻喉科、婦產科、皮膚科，皆能獲得確實之療效。

適應症：△下列疾患之消炎鎮痛：
關節痛及關節炎、神經痛及神經炎、腰背痛。
△手術及外傷後之消炎鎮痛。

用法用量：成人一日三次，每次1錠，必要時可增至2錠。對感染性疾患，可與化學治療劑併用。本藥須由醫師處方使用。

包裝：1000粒瓶裝。



消炎 止痛 膠衣錠 200毫克

成分：每一膠衣錠含 Ibuprofen ...200 mg

用法用量：成人：症狀持續時，每4-6小時服用一錠。若服用一錠後，疼痛及發燒現象未有改善，可服用兩錠。但24小時內勿服用超過6錠，除非有醫師指示。須用最小有效劑量。若服藥時有偶發性及中度心灼熱、胃不適或胃痛，可供服用食物或牛奶。若上述症狀的嚴重程度為中度以上或持續發生便須就醫。兒童：十二歲以下兒童不得使用本藥，除非有醫師指示或監護，醫師藥師藥劑生指示藥品

