

附件：**兒童用藥問題一覽表**

問題類型	用藥兒童	年齡	說明
藥品註銷許可證	林○○	2 歲 3 個月	95 年 1 月開出 Cisapride。該項藥品因未通過安全性評估，衛生署於 93 年 11 月撤銷許可證。
	顏○○	13 歲 11 個月	95 年 5 月 30 日開出 Sscanol。該項藥品的許可證在 93 年 7 月被註銷。
	陳○○	1 歲 6 個月	95 年 3 月開出 Actifed。該項藥品的許可證在 93 年 7 月被註銷。
	莊○○	2 歲 10 個月	分別在 95 年 3 月、94 年 2 月、95 年 1 月開出 Periactin。該項藥品的許可證於 93 年 12 月遭註銷。
	施○○	6 歲 9 個月	
	林○○	2 歲 3 個月	
兒童用藥安全疑慮	莊○○	1 歲 6 個月	開列 2 筆「2 歲以下小兒安全性未確定」的抗組織胺藥（Dexchlorpheniramin、Chlorpheniramine）
	柯○○	5 歲 3 個月	開列「不建議給 12 歲以下兒童使用」的氣管擴張劑（Bricanyl）。
	羅○○	1 歲	開列「不建議給 2 歲以下幼兒使用」的鎮咳劑（Dextromethorphan）
	陳○○	1 歲 6 個月	
藥性衝突	顏○○	13 歲 11 個月	腸溶錠不可跟制酸劑併用卻併用。
	林○○	2 歲 3 個月	開列止瀉劑抑制胃腸蠕動，又使用緩解脹氣藥品，促進胃腸蠕動。
重複用藥	林○○	2 歲 3 個月	共開出 13 筆藥品，其中 3-4 筆是複方，共含 16-21 種成分。至少有止瀉作用 4 種，止咳祛痰 2 種、消炎 2 種、抗組織胺 2 種。
	洪○○	5 歲 6 個月	開列 9 項藥品，有 4 項複方，共 17 種成分 重複用藥：抗組織胺 3 種、祛痰 4 種、3 種類交感神經藥物、止咳 2 種。
	施○○	6 歲 9 個月	10 筆藥品、11 種成分。 使用止咳 2 種、祛痰 2 種、抗組織胺藥 3 種、抑制中樞神經藥 3 種。
	游○○	6 歲	使用綜合感冒液劑 Secorine，內含緩解感冒各種症狀的多種成分，與其他藥物併用，產生重複用藥之虞。包括有 2 種「抗組織胺」藥品，可能加劇「嗜睡、過量時幻覺、激動」等副作用。有化痰藥 3 筆、支氣管擴張成分 2 筆。其中的 Theophylline 產生嘔吐、心律不整、顫抖等副作用大。

	張○○	5 歲 6 個月	使用綜合感冒液劑 Secorine、Anpirin 等複方。緩解鼻塞及流鼻水藥 2 筆、祛痰藥 3 筆。
	莊○○	1 歲 6 個月	抗組織胺 2 種、止咳祛痰 2 種、氣管擴張 2 種，其中 Theophylline 的副作用大。
	陳○○	1 歲 6 個月	開列複方 2 筆。有兩項抗組織胺。
	羅○○	1 歲	抗組織胺藥 2 種、止咳藥 2 筆。
	柯○○	5 歲 3 個月	含綜合感冒液劑 Secorine，使用抗組織胺 2 筆。
不宜磨粉	施○○	6 歲 9 個月	腸溶錠不宜磨粉：Voren 為非類固醇消炎止痛劑，容易傷胃，所以做成腸溶錠。把藥品透過特殊包膜，送到胃部慢慢釋出，避免藥品直接刺激腸胃道。
	林○○	2 歲 3 個月	
	張○○	5 歲 6 個月	膜衣錠具防潮、防變質作用，不宜磨粉破壞劑型。
藥錠切割、磨粉分包	林○○	2 歲 3 個月	一顆藥分成 12 包，每包含 0.083 顆，不易準確。
	莊○○	2 歲 10 個月	藥品總量 2.1 顆藥品，其中 0.1 錠不易切割。磨粉後分裝成 12 包，每包 0.18 錠，藥品劑量難準確。
	羅○○	1 歲	12 包藥，每包有 0.1 顆、0.15 顆、0.25 顆的劑量。
	洪○○	5 歲 6 個月	有 5 種藥丸，都要分成每包 0.38 顆。
	馮○○	9 個月	藥品總量開出 4.8 顆及 0.3 顆的畸零數字，要分成每包 0.4 顆、0.42 顆、0.4 顆、0.3 顆、0.25 顆的劑量。
	陳○○	1 歲 6 個月	有 2 種藥錠，都要分成每包 0.33 顆。另有 1 筆藥品，要分成每包 0.58 顆。
	張○○	5 歲 6 個月	有兩種藥錠，要分包成每包 0.58、0.41 顆。
不必要藥物	莊○○	1 歲 6 個月	開出鎮咳藥 2 筆，美國胸腔學會強力建議小兒咳嗽勿使用止咳祛痰藥，因為無效。 開出類固醇 1 筆。
	高○○	11 歲 6 個月	開出鎮咳藥 1 筆。美國小兒科醫學會不建議使用止咳藥品於小孩。
	柯○○	5 歲 3 個月	開出止咳藥 1 筆。美國小兒科醫學會不建議使用止咳藥品於小孩。
	羅○○	1 歲	Amantadine 100 mg，用於 A 型流感的預防治療。美國疾病管制局 2006 年表示，基於抗藥性因素，並不建議以本品治療或預防流感。
劑量過重	張○○	5 歲 6 個月	Pseudoephedrine HCl 60mg，建議每天劑量為 60mg，藥單上寫 120mg，有過量之虞。 祛痰用的 Ambroxol HCl 30mg，建議每天劑量為 30-45mg，藥單上寫開出 60mg，有過量之虞。
	羅○○	1 歲	開列體重達 20 公斤的兒童藥量，給 1 歲幼兒服用。
	游○○	6 歲	化痰用藥 Mucosolvan® 30 mg/錠，建議每天劑量為 30-45mg，藥單上寫開出 60mg。

	高○○○	11 歲 6 個月	用於化痰的 Mucosolvan Ambroxol HCl 30mg，建議每天劑量為 30-45mg，處方劑量為 90 mg，有過量之虞。
	施○○○	6 歲 9 個月	3 筆抑制中樞神經藥品，造成藥效加乘效果，有劑量過重之虞。
	莊○○○	1 歲 6 個月	Theophylline 過量易有副作用，所使用劑量有過量之虞。 所用抗鼻塞藥有過量之虞。 抗組織胺藥重複用藥，劑量過重。
劑量不足	張○○○	5 歲 6 個月	Clarithromycin 250mg，每天劑量為 495mg，藥單上寫 333.4mg。
	羅○○○	1 歲	預防支氣管氣喘藥物 Fenoterol HBr 2.5 mg，建議每天劑量為 7.5mg，藥單上寫 1mg，明顯不足。
藥名簡寫， 查無此藥	馮○○○	9 個月	查詢衛生署網站，查無 D-CTM、M-E 藥品，就算處方釋出，藥師也無法配藥。
	張○○○	5 歲 6 個月	查無「Epra」藥品名稱
	高○○○	11 歲 6 個月	查無「Rin」藥品名稱，可能為診所自創。如釋出處方箋，藥師無法調劑，更無法確認藥品正確性。
未標示單位 劑量	施○○○	6 歲 9 個月	Noscapine 沒有標示含量，查出 10、15、20mg 等不同含量。 Asverin 沒有標示含量，查出 10、20、60mg 等不同含量。
	顏○○○	13 歲 1 個月	Pseudoephedrine 沒標示含量，查出有 30mg、60mg。 Danzen 沒標示含量，查出有 5mg、10mg。
	高○○○	11 歲 6 個月	Medicon 有 5 mg、15 mg、30 mg 等含量； Acetaminophen 有 80mg、250 mg、300 mg、325 mg、500 mg 等不同含量。
	莊○○○	1 歲 6 個月	Bromhexine HCl 藥品未標含量，查出 4mg、8mg 等含量。 Theophylline 有 125、200、250、300、400mg/tab 等含量。 抗鼻塞 Pseudoephedrine HCL 藥品未標含量，查出 30mg、60mg 等含量。 Chlorpheniramine Maleate，查出有 0.12 mg/mL 或 0.4 mg/mL 等含量。
	馮○○○	9 個月	Vena 未標示含量，查出有 4、10、15mg 等含量。